

Pays : Burkina Faso	Année : 2017	Épreuve : Maths
Examen : BAC, Remplacement, 1 ^{er} Tour, Série D	Durée : 4 h	Coefficient : 5

EXERCICE 1 (04 points)

1. a) Déterminer le nombre complexe α tel que : $\alpha(1+i) = 1+3i$ puis calculer $i\alpha^2$.

b) Pour tout nombre complexe z , on pose : $f(z) = z^2 - (1+3i)z - 4 + 3i$.

Montrer que $f(z)$ peut se mettre sous la forme $(z-\alpha)(z-i\alpha)$.

En déduire les solutions dans \mathbb{C} , de l'équation : $f(z) = 0$.

2. Dans le plan complexe rapporté au repère orthonormal direct $(O; \vec{u}, \vec{v})$ d'unité graphique 2 cm, on considère les points A et B d'affixes respectives : $a = 2+i$ et $b = -1+2i$.

a) Placer les points A et B dans le repère.

La figure sera complétée au fur et à mesure.

b) Vérifier que $b = ia$ et en déduire la nature exacte du triangle OAB.

c) C est le point d'affixe $c = 1 + \frac{1}{2}i$.

Déterminer l'affixe d du point D tel que le triangle OCD soit isocèle et tel que : $\text{mes}(\widehat{OC, OD}) = \frac{\pi}{2}$.

d) On note J, K, L et M les milieux respectifs des segments [AB], [DA], [CD] et [BC].

Déterminer la nature exacte du quadrilatère JKLM. Justifier.

EXERCICE 2 (04 points)

Un jeu consiste à lancer quatre fois de suite, une pièce de monnaie bien équilibrée dont l'une des faces est notée F (Face) et l'autre P (Pile). On lit sur la face supérieure de la pièce. Si l'on obtient F alors on gagne 2 points, si l'on obtient P alors on perd 1 point.

Soit X la variable aléatoire réelle égale au nombre de points obtenus à l'issue des quatre lancers.

1. a) Déterminer l'univers Ω associé. (On pourra s'aider d'un arbre).

b) Calculer la probabilité d'obtenir 3 fois F (Face).

2. a) Déterminer les valeurs prises par la variable aléatoire X.

b) Déterminer la loi de probabilité de X.

c) Quelle est la probabilité d'obtenir des points strictement inférieurs à 8 ?

d) Déterminer la probabilité p' que la variable aléatoire X prenne une valeur strictement comprise entre -3 et 7.

3. a) Calculer l'espérance mathématique de X.

Le jeu est-il favorable au joueur ? Justifier.

b) Calculer la variance $V(X)$ et l'écart-type $\sigma(X)$ de X.

PROBLÈME (12 points)

Partie A (02,5 points)

1. Soit la fonction u définie sur \mathbb{R} par : $u(x) = xe^x$.

Étudier le sens de variations de u et en déduire que pour tout réel x , on a : $xe^x \geq -\frac{1}{e}$.

2. Soit la fonction g définie sur $]-\infty ; 0]$ par : $g(x) = 1 - (x^2 + x + 1)e^x$.

a) Étudier le sens de variations de g , puis dresser son tableau de variations.

(On ne demande pas la limite de g en $-\infty$).

b) Déduire de ce qui précède que : pour tout $x \in]-\infty ; 0]$, $g(x) \geq 0$.

Partie B (07,5 points)

On considère la fonction f définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x+1}{xe^x+1} & \text{si } x \leq 0 \\ f(x) = x \ln\left(\frac{x}{2}\right) + 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

On désigne par (C) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ d'unité graphique 2 cm.

1. a) Justifier que f est définie sur \mathbb{R} . (On pourra s'aider de la question 1 de la partie A).

b) Étudier la continuité de f en 0.

b) Étudier la dérivabilité de f en 0. En déduire les conséquences graphiques pour la courbe (C).

2. a) Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

b) Montrer que la droite (Δ) d'équation $y = x + 1$ est asymptote à la courbe (C) en $-\infty$.

Étudier les positions relatives de (C) par rapport à (Δ) sur $]-\infty ; 0]$.

3. a) Étudier le sens de variation de f sur $]-\infty ; 0]$, puis sur $]0 ; +\infty[$.

(On pourra montrer que $f'(x)$ et $g(x)$ ont le même signe sur $]-\infty ; 0]$.)

b) Dresser le tableau de variations de f .

4. Soit I le point de (C) d'abscisse -1 .

a) Montrer qu'une équation de la tangente (T) à (C) au point I est : $y = \frac{e}{e-1}(x + 1)$.

b) Étudier la position de (C) par rapport à (T). (On pourra utiliser le résultat obtenu dans la question A.1).

5. Construire la courbe (C), la tangente (T) et l'asymptote (Δ) .

Partie C (02 points)

1. Soit α un réel tel que : $0 < \alpha < 2$. On désigne par $\mathcal{A}(\alpha)$ l'aire en cm^2 de la partie du plan délimitée par la courbe (C), l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = \alpha$ et $x = 2$.

a) Calculer $\mathcal{A}(\alpha)$ au moyen d'une intégration par parties.

b) Calculer la limite de $\mathcal{A}(\alpha)$ quand α tend vers 0.

2. On considère la courbe (Γ) définie par le système :

$$\begin{cases} x = e^t \\ y = e^t(t - \ln 2) + 1, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

a) Déterminer une équation cartésienne de (Γ).

b) En déduire que (Γ) est une partie de (C) que l'on précisera.